



Epoxy-Activated Agarose Beads 6B

环氧活化琼脂糖凝胶 6B

货号: QS01046

版本: V1.0

发布日期: 2026 年 05 月 13 日

技术支持: 17302508337

公司官网: www.qianzhusong.com

目录

- [1. 产品概述](#)
- [2. 核心技术参数](#)
- [3. 产品特性与优势](#)
- [4. 偶联反应原理](#)
- [5. 标准使用流程](#)
- [6. 应用领域](#)
- [7. 质量控制](#)
- [8. 储存与运输](#)
- [9. 安全注意事项](#)
- [10. 常见问题解答](#)
- [11. 订购信息](#)
- [12. 技术支持与服务](#)

1. 产品概述

环氧活化琼脂糖凝胶 6B (Epoxy-Activated Agarose Beads 6B) 是江苏千株松生物科技有限公司自主研发生产的高性能预活化亲和和层析介质。本产品以 **6% 高度交联琼脂糖** 为基质, 在严格无水条件下引入高活性环氧基团。

与 4B 相比, 6B 基质具有更高的交联度、更好的机械强度和更大的比表面积, 孔径更小且分布均匀, 特别适合中等分子量生物分子的高载量偶联与快速纯化。该介质可直接与含有氨基 (-NH₂)、巯基 (-SH) 或羟基 (-OH) 的生物分子发生共价偶联反应, 形成稳定的醚键或仲胺键, 广泛应用于酶固定化、多肽纯化、小分子靶点筛选等领域。

注: 本产品不推荐用于 IgG 等大分子量抗体的纯化, 抗体纯化请选用我司环氧活化琼脂糖凝胶 4B (货号: QS01045)。

2. 核心技术参数

参数	典型值
基质	6% 高度交联琼脂糖凝胶
活化基团	环氧基 (Epoxy)
环氧基团密度	28-38 $\mu\text{mol/mL}$ 湿胶



参数	典型值
粒径范围	45-165 μm
最高推荐流速	150 cm/h
最大耐压	0.3 MPa (3 bar)
pH 稳定性 (工作)	4-9
pH 稳定性 (CIP)	3-11
化学稳定性	可耐受 8mol/L 尿素、6mol/L 盐酸胍、1% SDS
外观	白色均匀球形颗粒，无结块
储存条件	无水异丙醇，-20 保存

3. 产品特性与优势

- **超高机械强度**：6% 高度交联基质，可承受更高流速和压力，适合实验室到中试规模的连续化操作
- **高比表面积**：优化的孔径结构带来更大的比表面积，中等分子量配基偶联载量比 4B 高 20-30%
- **低空间位阻**：均匀的小孔径减少了配基分子间的相互干扰，提高了活性位点的有效利用率
- **储存稳定性极佳**：采用无水异丙醇，-20 保存，12 个月活性保留率 > 95%
- **低非特异性吸附**：天然琼脂糖基质，生物相容性好，非特异性吸附极低
- **偶联条件温和**：反应在中性至弱碱性条件下进行，最大程度保护酶和多肽的生物活性
- **键合稳定性高**：形成稳定的醚键或仲胺键，配基泄漏率 < 0.05%/ 次使用
- **适用范围广**：可偶联含氨基、巯基、羟基的多种生物分子
- **批次间一致性好**：严格的生产工艺控制，确保每批次产品性能稳定
- **即开即用**：预活化形式，无需复杂的活化步骤，节省实验时间

4. 偶联反应原理

环氧基团是一种高活性的三元环醚结构，在不同 pH 条件下可与不同亲核基团发生开环反应：

4.1 与氨基 (-NH₂) 的反应

- **反应条件**：pH 8.5-10.0，25-37°C，反应 16-24 小时
- **反应产物**：稳定的仲胺键
- **适用配基**：酶、多肽、中等分子量蛋白质、寡核苷酸等含伯氨基的生物分子
- **特点**：反应效率高，是最常用的偶联方式

4.2 与巯基 (-SH) 的反应

- **反应条件**：pH 7.5-8.5，25°C，反应 4-8 小时
- **反应产物**：稳定的硫醚键
- **适用配基**：含半胱氨酸的多肽、巯基化小分子、巯基化核酸等
- **特点**：反应速度快，特异性高，可实现位点特异性偶联



4.3 与羟基 (-OH) 的反应

- **反应条件:** pH 11.0-12.0, 37-45°C, 反应 24-48 小时
- **反应产物:** 稳定的醚键
- **适用配基:** 小分子醇类、多糖衍生物等
- **特点:** 需要较高的 pH 和温度

5. 标准使用流程

5.1 实验前准备

- 所有缓冲液均需使用高纯度去离子水配制, 并经 0.45 μ m 滤膜过滤脱气
- 准备翻转混合器、层析柱、离心管等实验器材
- 配基溶液应提前透析至偶联缓冲液中, 去除含氨基的杂质
- **重要:** 介质预处理应在临用前 30 分钟内完成, 避免环氧基团在水溶液中降解

5.2 介质预处理

1. 取所需体积的环氧活化琼脂糖凝胶 6B, 倒入 G3 砂芯漏斗中
2. **快速**用 10 倍柱床体积的冷去离子水洗涤, 彻底去除保存液中的**异丙醇**
3. **立即**用 5 倍柱床体积的预冷偶联缓冲液平衡 1 次
4. 将平衡后的凝胶转移至带塞的离心管中, 静置沉降后吸去多余上清液, 保留与凝胶等体积的上清液

⚠ 绝对注意事项:

- 整个洗涤过程应在 15 分钟内完成
- 切勿让介质在水溶液中长时间浸泡 (>30 分钟)
- 切勿抽干凝胶, 以免颗粒破裂影响柱效
- 洗涤后的介质必须立即用于偶联反应

5.3 配基偶联 (以酶 / 多肽为例)

1. 将酶或多肽配基溶解于偶联缓冲液 (推荐 0.1M Na₂CO₃-NaHCO₃, pH 9.0) 中, 浓度调整为 3-8 mg/mL
2. 将配基溶液与预处理后的凝胶按体积比 1:1 混合
3. 置于翻转混合器上, 25°C 缓慢翻转反应 16-20 小时 (酶配基建议 25°C, 多肽可提高至 37°C)
4. 反应结束后, 3000rpm 离心 5 分钟, 收集上清液
5. 采用 BCA 法或紫外分光光度法测定上清液中残留配基浓度, 计算偶联效率

偶联效率计算公式:

偶联效率 (%) = [(初始配基量 - 残留配基量) / 初始配基量] × 100%

5.4 封闭未反应的环氧基团

1. 吸去反应后的上清液, 加入等体积的封闭液 (推荐 1M 乙醇胺 - HCl, pH 8.0)
2. 置于翻转混合器上, 37°C 缓慢翻转反应 2 小时
3. 对于对温度敏感的酶配基, 可改用 0.1M Tris-HCl 缓冲液 (pH 8.0), 室温封闭 4 小时

5.5 洗涤与柱平衡

1. 依次用以下缓冲液各洗涤 3 次, 每次 5 倍柱床体积:



- 0.1M Tris-HCl + 0.5M NaCl, pH 8.0
- 0.1M 乙酸 - 乙酸钠 + 0.5M NaCl, pH 4.0

2. 重复上述酸碱交替洗涤步骤 3 轮, 以彻底去除未偶联的配基和封闭剂
3. 最后用您的实验缓冲液 (如 PBS, pH 7.4 或酶反应缓冲液) 平衡至 pH 稳定

5.6 偶联后介质的保存

- 偶联后的酶介质建议保存在酶反应缓冲液中, 添加 0.02% 叠氮钠抑菌
- 多肽偶联介质可保存在含 0.02% 叠氮钠或 20% 乙醇的 PBS 缓冲液中
- 4°C 避光保存, 避免反复冻融
- 长期保存建议每 3 个月更换一次保存液

6. 应用领域

6.1 酶固定化与生物催化

- 固定化各种工业用酶和诊断用酶, 制备固定化酶反应器
- 提高酶的热稳定性、pH 稳定性和有机溶剂耐受性
- 实现酶的重复使用和连续化生产, 降低生产成本
- 特别适合固定化分子量在 20-100kDa 之间的大多数工业酶

6.2 多肽与小分子配基固定化

- 偶联合成多肽、天然多肽和小分子化合物
- 制备多肽亲和柱, 用于分离纯化对应的受体蛋白
- 固定化小分子抑制剂或激动剂, 用于靶点蛋白的筛选与纯化
- 用于药物研发中的小分子 - 蛋白质相互作用研究

6.3 核酸与寡核苷酸固定化

- 偶联寡核苷酸探针和 DNA 片段
- 制备核酸亲和柱, 用于分离纯化特定的核酸结合蛋白
- 用于核酸 - 蛋白质相互作用研究和基因表达调控研究
- 固定化 RNA 分子, 用于 RNA 结合蛋白的分离与鉴定

6.4 中等分子量蛋白质纯化

- 固定化酶底物、抑制剂或辅因子, 用于酶的特异性纯化
- 固定化受体蛋白, 用于分离纯化对应的配体分子
- 用于蛋白质 - 蛋白质相互作用研究和蛋白质组学分析

6.5 其他应用

- 制备固相合成载体, 用于多肽和寡核苷酸的固相合成
- 固定化细胞或细胞器, 用于生物转化和代谢研究
- 用于样品前处理, 去除复杂样品中的特定杂质

7. 质量控制

江苏千株松生物科技有限公司对每批次环氧活化琼脂糖凝胶 6B 产品进行严格的质量检测, 确保产品性能符合标准:

1. **外观检查:** 白色均匀球形颗粒, 无结块、无异物



2. 粒径分布：激光粒度仪检测，90% 以上颗粒在 45-165 μ m 范围内
3. 环氧基团密度：硫代硫酸钠滴定法，每批次 $\geq 28\mu\text{mol/mL}$ 湿胶
4. 偶联效率测试：以牛血清白蛋白 (BSA) 为模型蛋白，偶联效率 $\geq 90\%$
5. 溶胀度测试：干胶溶胀后体积 $\geq 12\text{mL/g}$ 干胶

每批次产品均附带详细的质检报告，用户可通过技术支持热线查询。

8. 储存与运输

8.1 储存条件

- 未开封产品：-20 $^{\circ}\text{C}$ 避光密封保存
- 保存液：无水异丙醇（水分含量 $< 0.1\%$ ）
- 有效期：自生产之日起12 个月（在规定储存条件下，环氧基团活性保留率 $> 95\%$ ）

8.2 运输条件

- 常温运输，避免阳光直射和高温环境
- 运输过程中防止剧烈震荡和挤压
- 冬季运输注意防冻，如发现产品结冰，应立即联系技术支持

8.3 开封后保存

- 开封后应尽快使用，剩余介质应立即密封
- 补充适量新鲜无水异丙醇，确保介质完全浸没
- -20 $^{\circ}\text{C}$ 密封保存，有效期为开封后 12 个月
- 避免与氧化剂、强酸、强碱、含羟基 / 氨基化合物等物质接触

9. 安全注意事项

- 本产品仅用于科研实验，不得用于临床诊断或治疗
- 操作时应穿戴实验服、手套和护目镜，避免直接接触皮肤和眼睛
- 保存液为异丙醇，易燃且具有一定刺激性，应在通风橱中操作
- 如不慎接触皮肤，立即用大量清水冲洗；如不慎入眼，立即用大量清水冲洗并就医
- 废弃的介质和实验废液应按照实验室危险化学品规定处理
- 偶联有毒或致病性配基时，应采取相应的安全防护措施

10. 常见问题解答

Q1: 环氧活化琼脂糖凝胶 6B 与 4B 的核心区别和适用场景是什么？

A: 两者的核心区别在于基质交联度、孔径大小和比表面积，具体对比如下：

参数	环氧活化琼脂糖凝胶 4B	环氧活化琼脂糖凝胶 6B
琼脂糖浓度	4%	6%
排阻极限 (球蛋白)	60,000-20 $\times 10^6$ Da	10,000-4 $\times 10^6$ Da
最高推荐流速	100 cm/h	150 cm/h
最大耐压	0.2 MPa	0.3 MPa
比表面积	中等	较高 (比 4B 高 20-30%)



参数	环氧活化琼脂糖凝胶 4B	环氧活化琼脂糖凝胶 6B
推荐应用	抗体、病毒、多糖等大分子	酶、多肽、小分子、核酸等
适用规模	实验室小规模	实验室到中试规模

Q2: 为什么 6B 不推荐用于 IgG 抗体纯化?

A: IgG 抗体的分子量约为 150kDa, 虽然在 6B 的排阻极限范围内, 但 6B 的小孔径会导致:

1. 抗体分子进入凝胶内部的阻力增大, 扩散速度减慢
2. 抗体分子在凝胶表面发生空间位阻, 影响偶联效率
3. 偶联后的抗体活性位点可能被凝胶基质遮挡, 降低结合能力
4. 抗体与目标抗原的结合反应受到空间限制

因此, 抗体纯化推荐使用孔径更大的 4B 介质或专用的 Protein A/G 亲和介质。

Q3: 无水异丙醇, 使用时需要注意什么?

A: 异丙醇具有一定的刺激性和易燃性, 但只要在通风橱中进行预处理操作, 并彻底洗涤去除, 就不会对后续生物实验产生影响。洗涤后的介质中异丙醇 <1ppm, 完全符合生物实验要求。

Q4: 预处理时为什么要快速洗涤?

A: 虽然洗涤过程中介质会短暂接触水, 但只要时间控制在 15 分钟以内, 环氧基团的水解损失可以忽略不计 (<3%)。如果洗涤时间过长或让介质在水中长时间浸泡, 会导致大量环氧基团水解, 严重降低偶联效率。

Q5: 偶联效率低怎么办?

- 检查配基溶液中是否含有 Tris、甘氨酸等含氨基的杂质, 这些物质会与配基竞争环氧基团
- 确保介质预处理过程快速完成, 避免环氧基团在水溶液中降解
- 适当提高配基浓度 (3-15mg/mL) 或延长反应时间
- 调整反应 pH 至 9.0-9.5, 多肽配基可提高反应温度至 37°C
- 确保介质在使用前已彻底去除保存液中的异丙醇

Q6: 非特异性吸附高怎么办?

- 在洗涤和洗脱缓冲液中加入 0.15-0.5M NaCl, 减少离子相互作用
- 增加洗涤次数, 或使用含 0.1% Tween-20 的缓冲液洗涤
- 确保封闭步骤充分, 未反应的环氧基团已完全封闭
- 选择合适的上样和洗脱条件, 优化 pH 和离子强度

Q7: 偶联后的酶介质可以重复使用多少次?

- 一般情况下, 偶联后的酶介质可重复使用 10-30 次
- 具体使用次数取决于酶的稳定性和反应条件
- 每次使用后应进行彻底的洗涤, 去除残留的底物和产物
- 如发现酶活性明显下降, 应更换新的介质

11. 订购信息



产品名称	货号	包装规格	库存状态
环氧活化琼脂糖凝胶 6B	QS01046-10mL	10mL	现货
环氧活化琼脂糖凝胶 6B	QS01046-25mL	25mL	现货
环氧活化琼脂糖凝胶 6B	QS01046-100mL	100mL	现货
环氧活化琼脂糖凝胶 6B	QS01046-500mL	500mL	3-5 天
环氧活化琼脂糖凝胶 6B	QS01046-1L	1L	5-7 天

定制服务：本公司可提供不同粒径、不同活化密度的环氧活化琼脂糖凝胶定制服务，满足您的特殊实验需求。

订购方式：

- 电话订购：17302508337
- 官网订购：www.qianzhusong.com

12. 技术支持与服务

江苏千株松生物科技有限公司致力于为客户提供优质的产品和专业的技术服务。如果您在使用本产品过程中遇到任何问题，请随时联系我们的技术支持团队。

技术支持热线：17302508337（工作日 9:00-18:00）

技术支持邮箱：support@qianzhusong.com

服务承诺：

- 所有产品均提供质量保证，如因产品质量问题导致实验失败，我们将免费为您更换产品
- 提供专业的技术咨询和实验方案指导
- 可根据客户需求提供定制化产品和服务
- 及时响应客户反馈，24 小时内给出解决方案

本产品手册内容如有更新，恕不另行通知。最新版本请访问公司官网查询。

© 2026 江苏千株松生物科技有限公司 版权所有